

伏見CKD連携パス

バリエーション (発生したら定期受診の前でも受診を勧めて下さい)

- 1. 血清Creが前回の1.3倍以上 (stage1-3)
- 2. 血清Creが $\geq 1$  mg/dL以上悪化 (stage4-5)
- 3. 尿蛋白の急激な増加
- 4. Hb 11 g/dL以下
- 5. コントロール不能の高血圧
- 6. 肺水腫
- 7. 浮腫の急激な悪化

患者氏名 性別

生年月日 (西暦) 年 月 日 歳

- ◎ 必須項目
- 病状に応じて施行

施設	かかりつけ医 ( )													
	専門医 ( )	○												
経過		開始時	1ヶ月後	2ヶ月後	3ヶ月後	4ヶ月後	5ヶ月後	6ヶ月後	7ヶ月後	8ヶ月後	9ヶ月後	10ヶ月後	11ヶ月後	
実施日	西暦 年													
診察・測定	診察室血圧 (mmHg)	◎												
	家庭血圧 (mmHg)	◎												
	身長 ( ) (cm) / 体重 (kg)	◎												
検査	尿蛋白定性	○												
	尿蛋白/尿Cre (部分尿) (mg/dL)	○												
	血清Cre (mg/dL)	○												
	推算GFR (ml/min/1.73 m <sup>2</sup> )	○												
	K (mEq/L)	○												
	Hb (g/dL)	○												
お入こ 使力の いな欄 下どは さご検 い自査 由結 に果														
	胸部レントゲン	○												
	心電図	○												
評価	CKDステージ													
	合併症	<input type="checkbox"/> 有 ( ) <input type="checkbox"/> 無												
指導・説明	食事指導	カロリー kcal 塩分 g 蛋白質 g <input type="checkbox"/> カリウム制限												
	生活指導	<input type="checkbox"/> 禁煙 <input type="checkbox"/> 減酒 <input type="checkbox"/> 減量 <input type="checkbox"/> 禁煙 <input type="checkbox"/> 減酒 <input type="checkbox"/> 減量 <input type="checkbox"/> 禁煙 <input type="checkbox"/> 減酒 <input type="checkbox"/> 減量 <input type="checkbox"/> 禁煙 <input type="checkbox"/> 減酒 <input type="checkbox"/> 減量												
薬剤	薬剤変更の必要性	<input type="checkbox"/> 有 ↓ <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 ↓ <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 ↓ <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 ↓ <input type="checkbox"/> 無												
かかりつけ医から連絡/かかりつけ医へ報告		目標血圧 診察室 / mmHg未滿 家庭 / mmHg未滿												
CKDステージ GFR (ml/min/1.73 m <sup>2</sup> ) (蛋白尿を入れた詳細な分類は連携パス説明書 をご覧ください)														
G1 90以上														
G2 60-89														
G3a 45-59														
G3b 30-44														
G4 15-29														
G5 15未滿														

再診時には最近の検査データ・処方内容の添付をお願いします。